

# IDROFLOG

Solución oftálmica - envase de 10 ml

## Composición

Hialuronato de sodio 2 mg/ml, hidrocortisona fosfato de sodio 10 µg/ml, citrato trisódico, cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de magnesio, fosfato de sodio dibásico, fosfato de sodio monobásico, agua purificada.

## Qué es IDROFLOG y para qué se utiliza

IDROFLOG es una solución oftálmica que contiene hialuronato de sodio que, gracias a sus propiedades mucomiméticas y pseudoplásticas, se distribuye uniformemente sobre la superficie ocular formando una capa protectora viscoelástica. De este modo, al ejercer una acción mecánica (efecto barrera), IDROFLOG estabiliza la película lagrimal y reduce la fricción causada por los movimientos oculares y el parpadeo; protege la superficie ocular, favoreciendo los procesos de reparación, como consecuencia de las alteraciones en las células del epitelio corneal debido a una hiposecreción de la película lagrimal. De hecho, si las glándulas que secretan la película lagrimal reducen, por diferentes factores, su actividad normal, la superficie corneal queda más expuesta a los factores externos. Con el tiempo, estos causan disfunciones en las células epiteliales corneales con el riesgo asociado de que aparezcan procesos inflamatorios molestos. La aplicación de IDROFLOG protege la superficie corneal de la exposición a factores externos y, gracias a la acción complementaria de la hidrocortisona fosfato de sodio (agente corticoide a dosis baja, potencia antiinflamatoria baja y corta duración de acción), contribuye a prevenir el riesgo de posibles recurrencias de procesos inflamatorios.

IDROFLOG debe usarse durante un periodo de tiempo limitado y, en cualquier caso, bajo la supervisión directa del médico especialista.

IDROFLOG, gracias a su particular composición salina, restaura y mantiene a niveles fisiológicos las concentraciones de importantes iones, como el sodio, el potasio y el magnesio, que son esenciales para mantener la superficie ocular en buen estado de salud.

El producto no contiene conservantes.

## Cuándo no se debe utilizar

En caso de hipersensibilidad conocida a alguno de sus componentes o a otras sustancias químicamente relacionadas.

En casos de infecciones víricas de la superficie ocular, úlceras por queratitis, micosis del ojo, conjuntivitis purulenta, blefaritis purulenta y herpética, orzuelos.

En general, está contraindicado durante el embarazo y la lactancia y en niños.

## Conducción y uso de máquinas

IDROFLOG, debido a sus propiedades viscoelásticas, puede provocar visión borrosa en el momento de la aplicación. Espere hasta que desaparezca este efecto antes de conducir o usar máquinas.

## Precauciones de uso

IDROFLOG es solo para uso externo.

IDROFLOG no debe ser utilizado inmediatamente antes de la administración de otros medicamentos tópicos de uso oftálmico y debe esperar 20 minutos tras la aplicación de los mismos.

Si los síntomas oculares empeoran durante el tratamiento, consulte a su médico lo antes posible.

El uso prolongado puede provocar efectos no deseados, por lo que el oftalmólogo debe establecer la duración total del tratamiento.

En caso de un proceso inflamatorio en curso, el oftalmólogo prescribirá el tratamiento antiinflamatorio apropiado para restaurar las condiciones fisiológicas de la superficie ocular.

Para reducir el riesgo de contaminación, cada envase debe ser utilizado por una única persona.

Lavarse muy bien las manos antes del uso.

Evitar que la punta del envase contacte con los dedos, el ojo, lentes de contacto o cualquier otra superficie. Evitar también que la punta del envase se ensucie.

## Cómo usar IDROFLOG

Retirar el tapón quitando el precinto de seguridad. Presionando el envase invertido, aplicar 1-2 gotas de IDROFLOG en el saco conjuntival, dejándolas caer desde arriba. Cerrar siempre el envase con el tapón después del uso. No dañar ni desmontar el frasco ni obstruir de forma mecánica el orificio dosificador. IDROFLOG es compatible con lentes de contacto.

## Con qué frecuencia y durante cuánto tiempo debería utilizarse IDROFLOG

La frecuencia y el tiempo de uso de IDROFLOG puede variar en cada paciente y en función de las recomendaciones del oftalmólogo. En general, aplicar 1-2 gotas de la solución en el saco conjuntival del ojo a tratar, 2-4 veces al día. La duración total del tratamiento es de 2-6 meses, pero debe ser establecida específicamente por el oftalmólogo y siempre bajo su control (se recomienda un seguimiento cada 30-45 días).

## Efectos adversos

En raras ocasiones se ha observado una visión ligeramente borrosa después de la aplicación, debido a la viscosidad de la solución. Durante la aplicación puede notar un ligero escozor. No obstante, esta sensación debe desaparecer. Si los síntomas persisten, contacte con su oftalmólogo. El cumplimiento de las indicaciones descritas en estas Instrucciones de uso reduce el riesgo de efectos adversos.

## Conservación y caducidad

IDROFLOG debe conservarse a una temperatura entre 2°C y 25°C. El producto no contiene conservantes. La solución debe usarse durante los 2 meses posteriores a la primera apertura del envase. Pasado este tiempo, desechar la cantidad restante.

## Advertencias

No utilizar IDROFLOG después de la fecha de caducidad indicada en el envase. La fecha de caducidad se refiere al producto íntegro y conservado correctamente.

No utilizar IDROFLOG si el envase está dañado.

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

IDROFLOG debe utilizarse por recomendación del médico.

En caso de incidentes graves, debe comunicarlos al Fabricante y a las Autoridades Competentes. El documento "Informe sobre seguridad y resultados clínicos" se puede consultar en la página web <http://www.alfaintes.it> y también está disponible en la base de datos europea sobre productos sanitarios EUDAMED, donde está vinculado al UDI-DI básico del producto en la URL: <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.

**UDI-DI básico:** 805848137IDROFLOGAM

## Presentación

Envase multidosis de 10 ml, sin conservantes.

Fabricante:

**ALFA INTES Industria Terapeutica Splendore S.r.l.**

Via Fratelli Bandiera, 26  
80026 Casoria (Italia)

Distribuido en España por:

**BRILL PHARMA, S.L.**

C/ Munner, 8  
08022 Barcelona (España)



STERILE A

CE 0373

3510201-02 de 12/2025