

Kelador[®] Airless

Lactoferrina liposomada

Crema 50 ml

Uso externo
Producto Sanitario para uso tópico



Descripción

La piel constituye la primera barrera protectora frente a elementos nocivos o potencialmente tóxicos, como, por ejemplo, los metales pesados. De hecho, en determinadas condiciones, especialmente el hierro, el plomo y el zinc, cuando se acumulan en la dermis, pueden desencadenar una serie de reacciones con la consecuente producción de radicales libres. La Lactoferrina de Kelador[®] Airless consigue desempeñar plenamente su actividad quelante frente a los iones metálicos gracias a su formulación en liposomas, útil para el tratamiento de alteraciones trófico-discrómicas del tejido dermo-epidérmico (patente europea). Los liposomas son partículas lipídicas de estructura similar a la de las membranas celulares. La ventaja derivada de esta tecnología no es solo la obtención de una mayor biodisponibilidad, sino también una mayor protección de la Lactoferrina frente a la desnaturalización.

Composición

Agua, lactoferrina liposomada, propanodiol, sepigel 305, miristato de miristilo, manteca de karité, palmitato de etilhexilo, aceite de jojoba, metilsulfonilmetano, acrilato C10-30 alquil acrilato crosopolímero, carbómero, EDTA disódico, hidróxido de sodio, etilhexilglicerina, caprilil glicol y fenoxietanol.

Indicaciones

Kelador[®] Airless, gracias a sus propiedades antioxidantes asociadas a la actividad quelante frente a los iones metálicos, se utiliza en el tratamiento de las discromías derivadas de hematomas, equimosis, equimosis post-quirúrgicas, discromías hemosiderínicas post-escleroterapia, discromías de IVC (insuficiencia venosa crónica) y de úlceras flebotáticas, así como en tratamientos post-láser (depilación láser, láser ablativo y no ablativo).

Modo de uso

Dos aplicaciones al día hasta que desaparezca el síntoma.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes del producto.

Advertencias

Mantener fuera del alcance de los niños. No utilizar el producto si el envase está dañado. No utilizar el producto después de la fecha de caducidad. La fecha de caducidad se refiere al producto íntegro (sin abrir) y conservado correctamente. El uso del producto, especialmente en casos de uso prolongado, podría dar lugar a episodios de sensibilización; si esto ocurre, interrumpa el tratamiento y consulte a su médico. Es importante que informe a su médico o farmacéutico de cualquier efecto secundario no descrito en estas Instrucciones de uso.

Precauciones de uso

En mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y en niños menores de 3 años, se recomienda consultar a un médico antes de usar el producto. No utilizar el producto en heridas abiertas. El uso simultáneo de cremas y/o productos similares en la misma parte del cuerpo puede reducir la efectividad y seguridad del producto.

Conservación

Conservar el envase bien cerrado, a temperatura inferior a 25 °C, en un lugar seco, protegido de la luz y alejado de fuentes calor.

Presentación

Envase airless de 50 ml dentro de una caja de cartón.

Distribuido por: **BRILL PHARMA, SL C/** Munner, 8 - 08022 Barcelona (España)

Fabricante: **TDC Technology Dedicated to Care S.r.l.** Via Copernico, 38 - 20125 Milano (Italia)

0425

ES00587DCA5 REV.2 del 07/04/2025

50 ml

Patentado
Patente Europea